



Organizace péče

Doporučuje se vypracování formalizovaného protokolu/standardu pro včasný záchyt těhotných se známkami sepse a definování procesu péče po aktivaci systému včasného varování na konkrétním pracovišti. Důležité je zavedení tzv. *rapid response systému* (dále také RRS, systém časného varování), kdy k aktivaci systému může dojít už na podnět středního zdravotnického personálu. Smyslem systému „časného varování“ je zabránit u pacientů časové prodlevě zahájení léčby. Časová prodleva v léčebném postupu zhoršuje klinický výsledek exponenciálně.

	3	2	1	0	1	2	3
Dechová frekvence (počet dechů/min)	≤8			9 - 18	19 - 24	25 - 29	≥30
Saturace krve kyslíkem (%)	≤90		91-94	95 - 100			< 92% na O ₂
Srdeční frekvence (puls/min)		≤40	41 - 50	51 - 99	100 - 110	111 - 129	≥130
Systolický tlak (mmHg)	≤70	71-80	81 - 90	91 - 139	140 - 159	160 - 169	≥170
Diastolický tlak (mmHg)			≤45	46 - 89	90 - 99	100 - 109	≥110
Stav vědomí			agitace nebo zmatenost	bdělost	reakce na hlasový podnět	reakce na algický podnět	řádná reakce
Tělesná teplota (°C)		≤35,0	35,1 - 36,0	36,1 - 37,7	37,8 - 38,3	≥38,4	
Diuréza (ml/hod)	anurie	≤20	21 - 30	≥31			

NÍZKÉ RIZIKO 1-2	STŘEDNÍ RIZIKO 3-5	VYSOKÉ RIZIKO ≥6
Informovat vedoucí porodní asistentku	Informovat vedoucí porodní asistentku	Informovat vedoucí porodní asistentku
Zkontrolovat těhotnou za 1 hodinu	Zkontrolovat pacientku za 30 minut	Kontrolovat pacientku každých 5-15 minut v závislosti na klinickém stavu
Pokud není zlepšení stavu, informovat lékaře	Pokud není zlepšení stavu, informovat lékaře (porodník/anesteziolog)	Informovat vedoucího lékaře (porodník/anesteziolog)
	Vyhodnotit a vytvořit plán péče	Vyhodnotit a vytvořit plán péče
	Došlo s léčbou ke zlepšení stavu?	Došlo s léčbou ke zlepšení stavu?
	ANO NE	ANO NE
	Standardní odd.	Odd. intermediární péče nebo JIP
	Odd. intermediární péče skóres3	
	Lékařská kontrola za 30 min	Lékařská kontrola každých 15 min



ENDOWMENT FUND
FOR THE DEVELOPMENT
OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS

SINCE 1991